UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

GEORREFERENCIACIÓN, MONITOREO DE LA FENOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ESPECIES EN EL ARBORÉTUM DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

POR:

ORSON ONIL HERNANDEZ BENITEZ

TESIS



CATACAMAS OLANCHO

NOVIEMBRE, 2013

GEORREFERENCIACIÓN, MONITOREO DE LA FENOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ESPECIES EN EL ARBORÉTUM DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

POR:

ORSON ONIL HERNANDEZ BENITEZ

ASESOR PRINCIPAL

M.Sc. OSCAR FERREIRA CATRILEO

TESIS

CATACAMAS OLANCHO

NOVIEMBRE, 2013

DEDICATORIA

ARCELIA HERNANDEZ BENITEZ

AGRADECIMIENTO

AL CREADOR por dar la fuerza y el conocimiento que cualquier ser humano siendo creyente debe rendir su profundo agradecimiento.

A MI MADRE por brindarme todo su apoyo, comprensión, confianza y ser esa persona incondicional que siempre me apoyado.

A MI TIA Y HERMANA, por su apoyo constante.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, por ser mi segunda casa de aprendizaje tanto en la vida de las ciencias agrícolas como en el ámbito de los valores humanos y compartir grandes experiencias que lo ayudan a formar carácter y conocimientos.

AL MSc. OSCAR FERREIRA por su orientación y asesoría durante el desarrollo de la investigación.

AL Msc. ERLIN ESCOTO, por su asesoría durante esta investigación.

A MIS AMGOS, Kevin Fernando Granados, Walter Omar Gutiérrez y Maynor Juarez por tener una personalidad única y compartir un sin número de experiencias que se vuelven día con día más inolvidables.

CONTENIDO

Índice	pag
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	ii
CONTENIDO	iv
LISTA DE FIGURAS	v i
LISTA DE ANEXO	vi
RESUMEN	viii
I INTRODUCCIÓN	1
II OBJETIVOS	2
III REVISIÓN DE LITERATURA	3
3.1 Jardines botánicos y Arborétum	3
3.1.1 Características que definen un jardín botánico	3
3.2. Rotulación del Arborétum	4
3.3 Dendrología	4
3.3.1. Posición de la dendrología en la ciencia forestal	5
3.4. Fenología	5
3.4.1 Acontecimientos fenológicos	6
3.4 Floración	6
3.5 Fructificación	7
3.5.1 Factores que influyen sobre la fructificación	7
3.6 Conservación in situ	7
3.7 Conservación ex situ	8
IV MATERIALES Y METODOS	9
4.1 Descripción del lugar	9
4.2 Descripción de la investigación	10
4.3 Materiales y equipo	10
4.4 Toma de coordenadas con GPS (Sistema de Posicionamiento Global)	10

4.5 Elaboración de mapas	10
4.6 Identificación de las especies	12
4.7 Registro de la información de campo	12
4.8 Toma de fotografías	12
4.9 Rotulación de especies	12
4.10 Formato de presentación de la información	13
4.11 Colocación de los rótulos con respecto a los árboles	14
4.12 Ubicación de los rótulos	14
4.13 Toma de datos y formato de presentación del monitoreo de la fenología	14
4.14 Descripción botánica	15
4.15 Elaboración de rutas o senderos	15
4.16 Preparación de la información para la difusión en medios virtuales	15
RESULTADOS	17
5.1 Presentación de la información del Arborétum de Universidad Nacional de Agricu	ltura17
5.2 Rutas o senderos del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura	95
5.3 Mapa de todas las especies presentes en el Arborétum de la Universidad Nacional Agricultura.	
VI CONCLUSIONES	97
/II RECOMENDACIONES	98
III BIBLIOGRAFÍA	99
ANEXOS	101

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Vista panorámica de la Universidad Nacional de Agricultura	9
Figura 2. Diagrama de los componente y la información utilizada para la elaboración de mapa	
Figura 3. Diagrama de la presentación de la información de cada especie	13
Figura 4. Rutas del sendero de la Universidad Nacional de Agricultura	.94
Figura 5. Mapa del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura	.95

LISTA DE ANEXO

Anexo 1. Imágenes de la colocación de los rótulos del Arborétum de la Un	niversidad
Nacional	de
Agricultura	101
Anexo 2. Formato de hoja de campo para la recolección de datos fenológicos de o especies en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura	
Anexo 3. Límites del Arborétum de la universidad Nacional de Agricultura	103

Hernández Benítez, O.O, (2013) Georreferenciación, monitoreo de la fenología y descripción botánica de las especies en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, Tesis Ing. Agr. Universidad Nacional de Agricultura Catacamas, Olancho, Honduras, 115 p.

RESUMEN

Este estudio se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional de Agricultura ubicado a seis kilómetros de la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho, Honduras. Se georreferenciaron y rotularon 76 especies de plantas del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, y se elaboró una base de datos de 563 árboles dentro del área del Arborétum. Se monitoreó la fenología durante la época lluviosa, entre los meses de junio a octubre del 2013, cada semana se visitaron cada una de las plantas del Arborétum, evaluando los parámetros: caída del follaje, floración, fructificación, hojas nuevas y hojas viejas. Se utilizaron sistemas de información geográfica para la realización de los croquis y mapas de ubicación de las plantas de la colección, proponiendo dos rutas o senderos, una ruta corta y una larga, para recorrer las plantas del arborétum. arbórea del campus universitario. Además se realizó la descripción botánica de las 76 especies, con el objetivo de recopilar información de interés botánico, incluyendo el nombre científico, familia, nombre común, uso, origen y etimología, además de imágenes de la hoja, fruto, flor o inflorescencia, corteza y el árbol, tomadas en este estudio. En el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura se promueve la conservación ex-situ e in-situ y la investigación y monitoreo de la diversidad, ayudando a concientizar sobre la biodiversidad de plantas nativas, exóticas y endémicas a los estudiantes, los visitantes y a la comunidad en general.

Palabras claves: Biodiversidad, etimología, dendrología, conservación ex-situ e in-situ, árboles.

I INTRODUCCIÓN

Los árboles son parte imprescindible en un ecosistema, sirviendo como hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y suministran un sin número de productos útiles para el hombre.

Honduras es un país de vocación forestal la cual se encuentra entre el 75% y 88% de su territorio. A pesar de esto, el desarrollo de diferentes actividades económicas tales como la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el cultivo de café y otros productos agrícolas de exportación y el uso sin renovación de madera y leña para fines domésticos, artesanales e industriales, ha llevado a que en la actualidad la cobertura forestal real alcance solo al 57.6% de las áreas con aptitud forestal del país, lo cual representa una pérdida de alrededor del 40% (Pratt y Quijandria 1997).

Los jardines botánicos cumplen sus principales funciones en la ciencia, la horticultura y la educación. En las últimas décadas, se han convertido en importantes centros de conservación de la biodiversidad, jugando un papel importante en la conservación integral y el desarrollo lo cual indica que es una de las labores que debemos realizar para servir como centro de enseñanza.

En el presente trabajo se realizó la georreferenciación de ochenta especie de plantas que se encuentran en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura las cuales están debidamente identificadas con sus respectiva rotulación y el monitoreo fenológico en los meses de julio, Agosto y septiembre, lo cual nos proporcionara la debida información para poder poseer un mapa con todas las especies y un sendero como ruta de aprendizaje.

II OBJETIVOS

General

Georreferenciar, monitorear la fenología y describir taxonómicamente los árboles que se encuentran en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.

Específicos

- a. Georreferenciar y elaborar mapas de los árboles ubicados en el Arborétum del campus de la Universidad Nacional de Agricultura.
- Realizar la descripción taxonómica de los árboles y monitorear la fenología durante la época lluviosa de las especies del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.
- c. Estructurar la información taxonómica para la rotulación de los árboles en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, y su difusión en medios impresos y virtuales.

III REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 Jardines botánicos y Arborétum

Una definición de un jardín botánico dada por la Asociación Internacional de Jardines Botánicos (IABG) describe que jardín botánico o arborétum es aquel que se encuentra abierto al público y en el cual las plantas se encuentran debidamente rotuladas. Sin embargo la estrategia para la conservación de jardines botánicos contiene una lista amplia de características que definen un jardín botánico y donde se tiene en cuenta la diversidad de labores que estas instituciones deben llevar a cabo (Wyse y Sutherland, 2000).

3.1.1 Características que definen un jardín botánico

Según Ponce 2004, las características que definen un jardín botánico son:

- a) Plantas adecuadamente etiquetadas.
- b) Una base científicamente fundamentada para las colecciones.
- c) Una comunicación de información con otros jardines botánicos, instituciones, organizaciones y el público en general.
- d) Intercambio de semilla u otros materiales con otros jardines botánicos o estaciones de investigación.
- e) Responsabilidad y compromiso a largo plazo para el mantenimiento de las colecciones de plantas.
- f) Tener programas de investigación en taxonomía de plantas en herbarios asociados.
- g) Mantener un monitoreo de las plantas en la colección.
- h) Estar abierto al público en general para servir como fuente de aprendizaje.

- i) Promover la conservación a través de actividades de educación ambiental.
- j) Una documentación apropiada de las colecciones incluyendo el origen silvestre.
- k) Llevar a cabo investigaciones científicas o técnicas sobre las plantas en las colecciones.

3.2. Rotulación del Arborétum

En el proceso de la conservación de la biodiversidad es necesario identificar las plantas y esto tiene relación con la actividad científica, la identificación de las plantas es un eslabón de la cadena que pocas veces debería ser dejado de lado. Sin embargo debido a las dificultades inherentes del proceso mismo muchas veces no se identifican las plantas en el momento en que se hace el estudio y en otras ocasiones se establecen procedimientos de estudio que descartan la composición florística de las comunidades. Para empeorar las cosas una gran cantidad de plantas del mundo tropical no han sido ni siquiera clasificadas y se estima que solo unos 1500 taxónomos vegetales tienen la preparación adecuada para identificar las plantas tropicales, además de los métodos de enseñanza inadecuados y de la altísima biodiversidad tropical hacen falta herbarios y jardines botánicos (Jiménez, s.f.).

3.3 Dendrología

Según Aldrovandi (1688) la dendrología es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas leñosas, principalmente árboles y arbustos. Se centra sobre todo en las especies de importancia económica, examinándolas desde el punto de vista sistémico y fitogeográfico, pero también en los aspectos anatómicos y fisiológicos, en relación con el crecimiento del tronco, la producción de madera, y aspectos ecológicos de su crecimiento.

La dendrología es la rama de la botánica que estudia la identificación, distribución y clasificación de las plantas leñosas, principalmente árboles arbustos y sus maderas, con esto se busca la identificación de los árboles, apenas por los caracteres de real valor taxonómico

y filogénico como también y principalmente por la valorización de elementos diagnósticos más fácilmente reconocibles más allá de ser carentes de mayor fundamento científico subyacente a la botánica sistemática (Morales 2010)

3.3.1. Posición de la dendrología en la ciencia forestal

Los relevamientos dendrológicos permiten distinguir las especies deseables en el conjunto de una vegetación, en los diferentes estados de desarrollo, tornando así información indispensable para el adecuado manejo forestal, y proporcionando la información deseable para llevar a cabo muchos trabajos.

3.4. Fenología

De acuerdo con Vásquez 2007, entendemos por fenología al estudio de los cambios visibles de los procesos vitales básicos que se producen en un vegetal en el transcurso de un ciclo o periodo que abarcan la foliación, floración, fructificación, colorido otoñal del follaje y su caída con la consecuente exhibición de la estructura de tronco y ramas, para lograr la conservación de la biodiversidad, la educación tiene un importante papel para crear una conciencia global de los problemas ambientales que afrontamos y que se manifiestan en la fenología para crear las condiciones que nos lleven a un futuro sustentable.

Como es natural estos fenómenos se relacionan con el clima de la localidad en que ocurre y viceversa, de la fenología se puede sacar secuencias relativas al clima y sobre todo al microclima.

La fenología es un puente de unión entre la meteorología y la biología; y la podemos definir de forma entendible como la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de vida, dicho de otra forma, observamos el paso de las estaciones con sus

cambios de temperatura, humedad, régimen de lluvias, etc. A lo largo del año y lo relacionamos con la llegada o marcha de ciertas etapas (Puertas 2009).

Según Castillo y Castro (1989) manifiestan que el registro de la variación de las características fenológicas de los arboles es de suma importancia, no solo en la comprensión de la dinámica de las comunidades forestales sino también como un indicador de la respuesta de estos organismos a las condiciones climáticas.

3.4.1 Acontecimientos fenológicos

Para un estudio de fenología se deberían tomar en cuenta los acontecimientos fenológicos: (i) fase y (ii) fecha.

Fase: Es la relación de los vegetales ante los cambios del medio circundante, mediante la aparición, transformación o desaparición de órganos, brotes, frutos, etc.

Fecha: Es de gran importancia ya que la fenología registra fundamentalmente la fecha en que se producen las fases. La determinación de la fecha en que se produce una definida fase se denomina fenodata. En la fenología se trazan las isofenas que son las líneas que unen los puntos donde un fenómeno de la naturaleza (fase) tiene lugar a la misma fecha (Caiza 2011).

3.4 Floración

La edad en que los árboles comienzan a florecer y la fecha del inicio de la floración varía considerablemente entre los individuos de la misma especie que crecen dentro de un rodal. A sí mismo, se observa que algunos árboles florecen de modo consistente más temprano en la época, o bien más tarde en otros casos, su floración es más o menos abundante. Esta variabilidad puede deberse, en parte a las condiciones micro ambiental, pero es más

probable que se deba al resultado de los mecanismos inherentes. La tendencia de un árbol en lo relativo a su floración puede explicarse en términos genéticos al realizar un alto nivel de control genético permite al fitomejorador reducir la edad usual de floración de las especies (Castillo y Castro 1989).

3.5 Fructificación

Hawley (1982) manifiesta que los arboles por lo general, no producen una cosecha abundante de semillas cada año, si no que existe una cierta periodicidad cíclica en la producción de semillas que manifiesta como una cosecha muy abundante en un año seguido de un periodo variable en el cual la producción es baja.

3.5.1 Factores que influyen sobre la fructificación

Según Theodore (1982) dice que una vez que se forman las yemas reproductivas, su evolución hasta la formación de semillas maduras variables depende de la influencia que sobre ella ejercen:

- a) Causas fisiológicas
- b) Clima
- c) Nivel de nitrógeno
- d) Biota (insectos, enfermedades, aves y mamíferos)
- e) El tiempo adverso y las plagas de insectos intervienen con frecuencia para impedir la polinización o la maduración de las flores y frutos.

3.6 Conservación in situ

Según Rivas 2001, la conservación in situ se refiere al cuidado de la biodiversidad en su entorno natural en su sitio de origen. Además de atender el cuidado de una parte importante de los ecosistemas naturales, permite proteger las poblaciones de especies de flora

silvestres y por tanto procurar condiciones mínimas para el mantenimiento de su variedad genética en estado silvestre.

La conservación in situ de la diversidad biológica se realiza en las áreas en que esta ocurre naturalmente, procurando mantener la diversidad de los organismos vivos, sus hábitats y las interrelaciones entre los organismos y su ambiente (Spellerberg y Hardes 1992).

3.7 Conservación ex situ

De acuerdo con Otzet (2011) la conservación de especies ex situ es la que se lleva a cabo fuera de su hábitat natural, en recintos debidamente acondicionados, como complemento a la conservación in situ. La conservación ex situ contempla investigación, implementación de programas educativos y aplicación de medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de especies de flora amenazadas para introducirlas nuevamente en su hábitat natural. Para conservar especies ex situ se utilizan instalaciones como jardines botánicos, centros de investigación y universidades que se encuentren afines con la causa.

La conservación ex situ es un proceso que implica tanto el almacenamiento de los recursos genéticos en bancos de germoplasma, como el establecimiento de colecciones de campo y manejo de especies en cautiverio. El objetivo principal de la conservación ex situ es apoyar la supervivencia de las especies en sus hábitats naturales, por lo tanto debe ser considerada en toda estrategia de conservación como un complemento para la preservación de especies y recursos genéticos in situ (Codima 2000).

IV MATERIALES Y METODOS

4.1 Descripción del lugar

La investigación se realizó en el campus de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), ubicada a seis kilómetros al sureste de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho. La zona presenta una temperatura promedio anual de 25 °C, humedad relativa promedio de 74%, una altitud de 350 msnm y una precipitación de 1300 milímetros anuales (Muñoz 2012).



Figura 1. Vista panorámica de la Universidad Nacional de Agricultura, donde se llevó a cabo el estudio de monitoreo de la fenología y georreferenciación del arborétum

.

El trabajo se realizó entre los meses de julio a octubre del año 2013, y consistió en georreferenciar, el monitoreo de la fenología y descripción botánica de setenta y seis especies en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.

4.2 Descripción de la investigación

Se tomó como base investigaciones realizadas en otras universidad como la realizada en la Escuela Panamericana del Zamorano en (2008) y otros estudios en universidades internacionales, el estudio se dirigió al monitoreo de la fenología de setenta y seis especies presentes en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, con su debida georreferenciación y la descripción botánica de las antes mencionadas.

4.3 Materiales y equipo

En la ejecución del trabajo para la georreferenciación se necesitó de la ayuda de un GPS (Sistema de posicionamiento global), computadora portátil, softwares para la realización de mapas (ArcGIS[®] y AutoCAD), en la toma de las fotografías se usó una cámara fotográfica (Canon[®]). En la toma de la fenología lápiz grafito, libreta de apuntes, Microsoft Excel[®] para la tabulación de datos del monitoreo de la fenología.

4.4 Toma de coordenadas con GPS (Sistema de Posicionamiento Global)

Se tomó las coordenadas de todos los árboles presentes en el campus de la Universidad Nacional de Agricultura, en este caso 563 árboles, además de las 76 especies del Arborétum de la universidad que fueron rotuladas como parte de este estudio, con el objetivo de tener la ubicación exacta donde se encuentran cada planta muestreadas a través de las coordenadas UTM.

4.5 Elaboración de mapas

Se elaborarón mapas de ubicación de todos los árboles del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, haciendo uso de un GPS (Garmin[®] 490) para la toma de coordenadas seguidamente se utilizó Map Source[®] y se hizo uso de ArcGIS[®], para

descargar, crear capas de ubicación geográfica y elaborar los mapas respectivamente (Figura 2).

Se creó un sendero llamado "La Guacamaya" que es el más corto y un sendero más largo llamado "Ylang Ylang", los cuales juntos forman el sendero completo. Se considera que la universidad cuenta con uno de los Arborétum más completos del país, con una alta biodiversidad, con una gran variedad de especies nativas y exóticas, además de que los árboles están debidamente rotulados.

De forma natural están presentes todos los árboles y/o flores nacionales de los países centroamericanos (*Swietenia macrophylla* = Belice, *Ceiba pentandra* = Guatemala, *Tabebuia rosea* = El Salvador, *Pinus oocarpa* = Honduras, *Calycophyllum candidissimum* = Nicaragua, *Enterolobium cyclocarpum* = Costa Rica y *Sterculia apetala* = Panamá). También se encuentran los árboles y flores nacionales de varios países del caribe y de Sudamérica.




Figura 2. Diagrama de los componentes e información utilizada para la elaboración de mapas, en el estudio del monitoreo de la fenología y georreferenciación de las especies del arborétum de la universidad

4.6 Identificación de las especies

Se consideraron e identificaron ochenta especies presentes en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, que tuvieran una importancia económica, ecológica, estética u ornamental. Las especies seleccionadas para este Arborétum son en su mayoría del bosque seco tropical debido a la ubicación geográfica de la Universidad Nacional de Agricultura en la ciudad de Catacamas, en Olancho, Honduras.

4.7 Registro de la información de campo

Se utilizó el programa de Microsoft Excel para el registro de datos fenológicos que se recolectaron en el estudio de monitoreo de la fenología para generar tablas con los datos obtenidos. El formulario utilizado fue simple, con espacio suficiente para recoger la información necesaria para el estudio.

4.8 Toma de fotografías

Se tomarón fotografías de ochenta especies de plantas. Se fotografió la flor, hojas (follaje), fruto, corteza y del árbol completo, con el propósito de representar con fotografías propias.

4.9 Rotulación de especies

Para la rotulación de las 76 especies del Arborétum, cada rótulo contó con la siguiente información: Descripción botánica y etimología, la presentación grafica en fotografías de la flor, fruto y del árbol completo, además del uso y el origen de la especie.

4.10 Formato de presentación de la información

Para este estudio se presenta la información descrita a continuación:

- a) Resultados del monitoreo de la fenología en la época lluviosa
- Fotografías de la flor, fruto, corteza, hoja y del árbol completo para cada una de las especies muestreadas
- Mapa de ubicación de las especies presentes en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura, y su ubicación dentro del campus universitario

También se elaboró un mapa en el que muestra los dos senderos propuestos para realizar el recorrido y de esta manera poder visitar todas las especies.




Figura 3. Diagrama de la presentación de la información de cada especie, en el estudio del monitoreo de la fenología y georreferenciación de las especies del Arborétum de la universidad

4.11 Colocación de los rótulos con respecto a los árboles

Los 76 rótulos se colocaron a una distancia considerable del árbol, y se eligió una posición determinada, con el propósito de que no sufra daños por el ambiente (exposición al sol, temperatura, viento, daños mecánicos antrópicos, entre otros) y además se tenga buen acceso al momento de hacer uso de la información.

4.12 Ubicación de los rótulos

Para la designación de la ubicación de los rótulos de las ochenta especies presentes en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura se tomaron varios criterios como:

- a) Ubicación en áreas de fácil acceso
- Seguridad para el público en general que lo visite (por ejemplo se consideró la cercanía a vías de acceso que pudieran poner en peligro a los que recorren el sendero
- c) Calidad del árbol en cual se colocará el rótulo
- d) Los árboles que fueron georreferenciados debían encontrarse dentro de los límites del campus universitario y específicamente dentro de los límites definidos del Arborétum (Anexo 6).

4.13 Toma de datos y formato de presentación del monitoreo de la fenología

Para cada especie se llevó a cabo el monitoreo fenológico de forma semanal durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2013, para lo cual se visitó cada uno de los 76 árbol de cada una de las especies consideradas en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.

El monitoreo de la fenología se realizó el primer día de la semana (domingo) en horas de la mañana realizando un recorrido por cada una de las 76 especies del Arborétum para poder recolectar la información fenológica, la cual fue tabulada y descrita semanalmente en un

formato el cual contiene las siguientes etapas fenológicas: caída del follaje, brotes, floración, fructificación, hojas nuevas y hojas viejas. Se utilizó Microsoft Excel[®] para la tabulación de los datos fenológicos recolectados.

4.14 Descripción botánica

Para la descripción de las especies se utilizaron manuales de dendrología y de taxonomía como guía para la identificación y correcta clasificación taxonómica, además de la etimología y la información incluida en los rótulos y en el estudio.

4.15 Elaboración de rutas o senderos

Se diseñaron rutas que sirvan de propuesta a la Universidad Nacional de Agricultura para promocionar una mejor educación ambiental y que el estudiante o visitante puedan apreciar los árboles y recorrer los senderos del Arborétum, ayudando a crear una conciencia de conservación y protección del ambiente.

4.16 Preparación de la información para la difusión en medios virtuales

Para su difusión en medios virtuales se presentará la información completa de las 76 especies para su colocación en la página web de la Universidad Nacional de Agricultura. En dicho documento también se describe el Arborétum para que el público en general lo pueda visitar y tenga un fácil acceso a dicha información a que el usuario quiera acceder.

V RESULTADOS

5.1 Presentación de la información del Arborétum de Universidad Nacional de Agricultura.

A continuación se presenta el monitoreo de la fenología representado en un cuadro dinámico, la descripción botánica, con su respectivo mapa de ubicación de las setenta y seis especies pertenecientes al Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.

Nombre Científico: Swietenia humilis

Familia: Meliaceae



Es una de las dos caobas nativas hondureñas, junto a la caoba del atlántico. Presenta hojas más pequeñas.

Etimología: El nombre del género *Swietenia* honra al médico austríaco del siglo XVIII, G. van Swieten. El nombre de la especie viene del latín y significa "bajo", por el tamaño del árbol.

Uso: Maderable Origen: Nativa



MON	TTO	REC	DE	FEN	OL) OGĹ	A: É	POC	CAL	LUV	IOS	Α, (AM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	•
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
N IXE		CAIDA DEL FOLLAJE														
1		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
A.		, T				I	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S	, T		, T		

Nombre científico: Lonchocarpus rugosus

Familia: Fabaceae Subfamilia: Faboideae



El nombre común cincho proviene del uso de la corteza para hacer aros o "cinchos" para prensar el queso.

Etimología: El nombre del género *Lonchocarpus* deriva del griego "fruto en forma de lanza". La especie significa "arrugada", en referencia a la superficie de las hojas.

Uso: Maderable Origen: Nativa



MON	TIOREO DE FENOLOGÍA: ÉPOCA LLUVIOSA, CAMPUS UNA Julio Agosto Septiembre Octubre 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CAIDA DEL FOLLAJE															
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octı	ubre	,
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A I	DEI	L FO	OLI	۵	E				
The state of the s		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UCI	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ A	AS I	NUI	E V A	S					
* Comments						H	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Erythrina berteroana


Familia: Fabaceae Subfamilia: Faboideae



El nombre común "pito" refleja el uso que dan los niños a la corola, como un silbato. Posee glándulas en el pecíolo.

Etimología: El nombre del género *Erythrina* proviene del griego "de color rojo", en referencia al color de las flores. La especie honra al naturalista italiano del siglo XIX, C. Bertero.

Uso: Sombra, Múltiple



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGÍ	4: É	POC	CAL	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
N XX		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
						H	ЮЈ	AS	VII	EJA	s					

Nombre científico: Averrhoa carambola

Familia: Oxalidaceae



Al cortarse transversalmente, la baya forma una estrella de 5 puntas. La planta contiene ácido oxálico (C2H2O4).

Etimología: El nombre del género *Averrhoa* honra al médico árabe del siglo XII, Ibn Rushd, o Averrhoes. La especie deriva de los nombres "caramba" y "kambola", ambos usados en Malasia.

Uso: Alimenticia

Origen: Exótica de Asia



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	4: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
The same of the sa		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
A.						F	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Crescentia alata

Familia: Bignoniaceae



Las semillas se utilizan para elaborar la bebida típica horchata. Se menciona en el libro mitológico Popol Vuh.

Etimología: El nombre del género *Crescentia* honra al agrónomo italiano del siglo XIII, P. Crescenzi. La especie se refiere al ala que rodea al pecíolo de la hoja.

Uso: Silvopastoril, Alimenticia



MON	ITO	REO	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	AL	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	4
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	L FO	OLI	۵	E				
The state of the s		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
A CO						I	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre Científico: Guaiacum sanctum


Familia: Zygophyllaceae



Es la flor nacional de Jamaica. Es considerada como una de las maderas más duras y densas del mundo.

Etimología: El nombre del género *Guaiacum* deriva del nombre indígena para el árbol. La especie significa "sagrado", en referencia a las propiedades medicinales contra la sífilis.

Uso: Maderable, Medicinal



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	_ F(OLI	ـAJ	E				
A service		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* S						H	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Tabebuia chrysantha


Familia: Bignoniaceae



Es el árbol nacional de Venezuela; el color amarillo de sus flores recuerda al de la bandera de este país.

Etimología: El nombre del género *Tabebuia* deriva del nombre indígena dado al árbol en Brasil. La especie proviene de dos vocablos griegos que significan "flor dorada".

Uso: Ornamental, Maderable



MON	то	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: ÉI	POC	CAL	LUV	TOS	A, C	AM	PUS	UN	4
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	emb	re	(Octı	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A I	ŒI	_ F(DLI	LAJ	E				
West of the second		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UCT	CIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ <i>A</i>	S I	NUI	E V A	S					
*						I	IOJ.	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Hevea brasiliensis

Familia: Euphorbiaceae




Es la fuente primordial del caucho natural, utilizado en neumáticos de los vehículos automotores desde 1839.

Etimología: El nombre del género *Hevea* deriva del nombre nativo del árbol dado en el Amazonas. La especie se refiere a su origen geográfico.

Uso: Industrial

Origen: Exótica de Sudamérica



MON	TO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É	POC	A L	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The same of the sa		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC	ГIF	ICA	CI	ÓN					
			•			Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
X						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S				, and the second	

Nombre científico: Polyalthia longifolia

Familia: Annonaceae




Exhibe un crecimiento piramidal simétrico muy peculiar. Posee semillas recalcitrantes, es decir poco longevas.

Etimología: El género *Polyalthia* viene del vocablo "curar a muchos", en referencia a las propiedades medicinales que presenta. La especie significa "hojas grandes".

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Asia



Nombre científico: Ceiba pentandra

Familia: Malvaceaae Subfamilia: Bombacoideae



Es el árbol nacional de Guatemala. Considerado como un árbol sagrado para los mayas.

Etimología: El género *Ceiba* deriva del nombre indígena dado al árbol. La especie se refiere a la presencia de cinco estambres en la flor. El fruto posee una lana llamada kapok.

Uso: Ornamental Origen: Nativa



MON	ITO	REO	DE	FEN	OLO	OGĹ	4: É	POC	CAL	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	4
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	:
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	ΟJ	AS I	NUI	EVA	s					
A CONTRACTOR						Н	ЮЈ	AS	VIE	EJA	\mathbf{s}^{-}					

Nombre científico: Jacaranda mimosifolia

Familia: Bignoniaceae




Es una planta originaria de Argentina.

Etimología: El nombre del género *Jacaranda* deriva del nombre indígena dado al árbol, que significa "fragante", en guaraní, hablado en Paraguay. El género se refiere al parecido con las hojas del género *Mimosa*

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Sudamérica



MON	TTO	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre)
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYX !					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	s					
* Company						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Simarouba glauca

Familia: Simaroubaceae



Es una especie saponífera -adecuada para la fabricación de jabón-. Las semillas poseen hasta 70% de grasa.

Etimología: El nombre del género *Simarouba* es el resultado de una confusión de Linnaeus, en el siglo XVIII, con el indio desnudo (*Bursera simaruba*). La especie significa "de color verde azulado".

Uso: Múltiple Origen: Nativa



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII	OA 1	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	s					
*						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Pinus oocarpa

Familia: Pinaceae



El pino es el árbol nacional de Honduras, aprobado por decreto legislativo No. 48, el 4 de febrero de 1927. En Honduras crecen de forma silvestre 7 especies de pino.

Etimología: El nombre del género *Pinus* significa "pino" en latín. La especie significa "con frutos en forma de huevos".



MON	то	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	•
VANY 1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
N IXE		CAIDA DEL FOLLAJE														
		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC.	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
* E						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Tabebuia rosae


Familia: Bignoniaceae



Es el árbol nacional de El salvador.

Etimología: El nombre común macuelizo proviene del náhuatl maquilishuat, que significa "cinco flores". El nombre del género Tabebuia deriva del nombre indígena dado al árbol. La especie se refiere al color de las flores.

Uso: Ornamental, Maderable



MON	TTO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	AL	LUV	TOS	Α, Ο	AM	PUS	UNA	4
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re	,	Octi	ubre	•
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYX.					C	AII)A l	DEI	_ F(DLI	LAJ	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	EVA	S					
* Company			, i	, i		I	ЮЈ	AS	VIE	EJA	\mathbf{S}			, i		

Nombre científico: Delonix regia

Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae



Es originaria de la isla de Madagascar.

Etimología: El nombre del género *Delonix* proviene del griego y significa "garra sobresaliente" en referencia a la forma de los pétalos. La especie significa "excepcional", refiriéndose a la belleza de las flores.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de África



					-									_	-	
MON	TTO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII	OA 1	DEI	_ F(OLI	LAJ	E			ı	
The same of the sa		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* Company						I	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Cassia fistula


Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae



Es la flor nacional de Tailandia. Con llamativas inflorescencias colgantes Se utiliza como un laxante suave.

Etimología: El nombre del género *Cassia* deriva del término utilizado por el botánico griego Dioscórides. La especie significa "tubo", en referencia a la forma del fruto.

Uso: Ornamental, Medicinal Origen: Exótica de Ásia



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CAL	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	4
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	L FO	OLI	۵AJ	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E VA	S					
X						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S			_		

Nombre científico: Spathodea campanulata

Familia: Bignoniaceae




Se le conoce como tulipán africano. Los capullos de la flor contienen agua y son usados por los niños para jugar.

Etimología: El nombre del género *Spathodea* se refiere a la forma de espada del cáliz, mientras que la especie deriva de la forma de campana que tiene la flor.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de África



MON	то	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	۸: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
A.S.		·				H	ЮЈ	AS	VII	EJA	S	·	·		·	


Nombre científico: Junglans olanchana

Familia: Juglandaceae



Posee una madera con un llamativo color café oscuro, conocida en el mercado internacional como nogal de Centroamérica.

Etimología: El género *Juglans* deriva de "bellotas de Júpiter", es decir unas nueces dignas de un dios. La especie se refiere al primer espécimen recolectado y descrito cerca del río Catacamas en 1949.



MON	то	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CAL	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	Ā
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC.	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
X						F	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S					


Nombre científico: Cordia alliodora

Familia: Boraginaceae



Es una madera preciosa muy apreciada. Por la forma de su copa es ideal para su uso en sistemas agroforestales.

Etimología: El género *Cordia* honra a los botánicos alemanes del siglo XVI, E. y V. Cordius. El nombre de la especie se refiere al leve olor a ajo que despide la corteza interior del árbol.



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
*						H	ЮJ	AS	VIE	EJA	\mathbf{s}^{-}					


Nombre científico: Swietenia macrophylla

Familia: Meliaceae



Es una madera preciosa muy apreciada a nivel nacional e internacional. Es atacada por el barrenador de las meliáceas *Hypsipyla grandella* (Lepidóptera: Pyralidae).

Etimología: El género *Swietenia* honra al médico austríaco del siglo XVIII, G. van Swieten. La especie significa "hojas grandes".



MON	TTO	REC) DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É l	POC	CAL	LUV	IOS	A, C	AM	PUS	UN	4
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre)
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A I	DEI	_ F(OLI	۵	E				
A STATE OF THE STA		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC]	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ A	4S I	NUI	E V A	S					
X		"	"		"	H	ЮJ	AS	VII	EJA	S				"	

Nombre científico: Samanea saman

Familia: Fabaceae Subfamilia: Mimosoideae



El nombre común se refiere al uso del tronco como ruedas de carretas de bueyes. También se conoce como "árbol de la lluvia", porque en días nublados las hojas se pliegan.

Etimología: Tanto el género *Samanea* como la especie, derivan de la lengua caribe y significa "árbol leguminoso".

Uso: Maderable, Silvopastoril



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
*		."			."	I	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{S}		, in the second			

Nombre científico: Senna siamea


Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae



Se utiliza ampliamente en ornato y en reforestaciones. Es una planta leguminosa que no fija nitrógeno.

Etimología: El nombre del género *Senna* proviene del vocablo árabe "arbusto espinoso". La especie se refiere a su origen geográfico, Siam, antiguo nombre de Tailandia.

Uso: Ornamental, Múltiple Origen: Exótica de Ásia



MON	ПO	REC) DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre)
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	_ F(OLI	_AJ	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
A.						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	s					

Nombre científico: Coccoloba acapulcensis

Familia: Polygonaceae



Se reconoce en el bosque por los llamativos colores del follaje. Posee frutos que atraen a la fauna silvestre.

Etimología: El nombre del género *Coccoloba* deriva del antiguo nombre griego para la vid, la planta de la uva. La especie se refiere a su origen geográfico. Posee una estípula ocrea.

Uso: Ornamental Origen: Nativa



MON	TO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É l	POC	CAL	LUV	IOS	Α, (AM	PUS	UN	A
		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re	(Octı	ubre)
11 /18 // 1 //	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A I	DEI	_ F()LI	۵	E	•			
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC1	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ A	AS I	NUI	EVA	S					
X					"	H	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum

Familia: Fabaceae Subfamilia: Mimosoideae



Es el árbol nacional de Costa Rica. Árboles majestuosos de esta especie predominan en el campus de la Universidad Nacional de Agricultura.

Etimología: El nombre del género *Enterolobium* significa "lóbulos de intestino"; la especie proviene del griego "fruta circular", en ambos casos refiriéndose a la forma de las frutas.

Uso: Sombra
Origen: Nativa



					-									-		
MON	TTO	REC) DE	FEN	OL) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>,</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
A Committee of the Comm		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
X						I	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{s}					

Nombre científico: Terminalia catappa

Familia: Combretaceae



Se cultiva ampliamente como ornamental y por la sombra que proporciona sus ramas simétricas horizontales.

Etimología: El nombre del género *Terminalia* se refiere a la agrupación de las hojas al final de la ramilla. El nombre de la especie se deriva de su nombre nativo en Malasia.

Uso: Ornamental, Sombra Origen: Exótica de Ásia



MON	ľЮ	REC) DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	•
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
*						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	s					

Nombre científico: Couroupita guianensis

Familia: Lecythidaceae



Se considera una curiosidad botánica. Cada fruto posee hasta 300 semillas. Es sagrado en India, debido a que los pétalos de la flor se asemejan a la cubierta de la deidad Năga.

Etimología: El género *Couroupita* deriva del nombre indígena dado en Guayana. La especie se refiere a su origen geográfico.

Uso: Ornamental, Ecólogica



MON	то	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CA L	LU	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre)
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	F	OLI	LAJ	E			-	
A STATE OF THE STA		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
Yes.						I	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Calycophyllum candidissimum

Familia: Rubiaceae



Es el árbol nacional de Nicaragua; se utiliza para adornar los altares de La Purísima, cada 8 de diciembre.

Etimología: El nombre del género *Calycophyllum* se refiere a la lámina que crece del cáliz de algunas flores. La especie significa "blanquísimo" en referencia al color de las flores.


Uso: Ornamental, Melífera



MON	ГО	REC) DE	FEN	OL) OGĹ	4: É	POC	A L	LUV	IOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
N XX					C	AII)A]	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
No.	· ·		· ·	· ·	· ·	H	ЮJ	AS	VIE	EJA	S	· ·			· ·	

Nombre científico: Cupressus lusitanica

Familia: Cupressaceae



Desde inicios del siglo XVII se importaron plantas de esta especie, de México hacia Portugal, las cuales fueron las primeras en ser descritas por los botánicos, en el siglo XVIII.

Etimología: El género *Cupressus* corresponde al viejo nombre dado a los cipreses europeos. El género significa "de Portugal".

Uso: Maderable, Ornamental



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	A L	LUV	IOS	A , (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octı	ubre	<u>:</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
West of the second		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* S			· ·			H	ЮJ	AS	VIE	EJA	S	· ·				, and the second

Nombre científico: Guazuma ulmifolia


Familia: Malvaceae



Los característicos frutos negros y leñosos pueden causar obstrucción intestinal si el ganado los come en exceso.

Etimología: El nombre del género *Guazuma* proviene del nombre común que se le da en México. La especie viene del latín "con hojas en forma de olmo".

Uso: Silvopastoril, Maderable



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CAL	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A 1	DEI	_ F(DLI	LAJ	E				
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
· All						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	s					

Nombre científico: Bauhinia monandra

Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae




Posee flores que se asemejan a orquídeas. Una flor estilizada de *Bahuina* aparece en la bandera de Hong-Kong.

Etimología: El género *Bahuina* honra a los botánicos suizos del siglo XVII, G. y J. Bahuin. El nombre de la especie se refiere a la presencia de un solo estambre en la flor.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de África



			-											-		
MON	<u> TTO</u>	REC) DE	FEN	OLO	OGL	4: E	POC	CA L	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	<u> </u>
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>,</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
N XX		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
X						H	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{S}					

Nombre científico: Cedrela odorata

Familia: Meliaceae



Se considera una madera preciosa, que por su trabajab ilidad es muy apreciada por los ebanistas.

Etimología: El nombre del género *Cedrela* corresponde al diminutivo de la palabra "cedro". La especie significa "fragante"; las hojas huelen a cebolla cuando se les estruja.



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
Waste .		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
X						I	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Cecropia peltata

Familia: Urticaceae



Presenta una simbiosis (mutualismo) con la hormiga del género *Azteca*, quien la defenderá vigorosamente.

Etimología: El nombre del género *Cecropia* se refiere a Cecrops, el mitológico fundador de Atenas, capital de Grecia. La especie se refiere a la hoja peltada especie de sombrilla.

Uso: Ecológica Pionera



			•			$\overline{}$	$\overline{}$					•		-	-	
MON	<u> 110</u>	REC) DE	FEN	OLO	OGL	A: E	POC	CAL	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII	OA 1	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
A STATE OF THE STA		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
*						I	ЮJ	AS	VII	EJA	s					

Nombre científico: Ficus benjamina

Familia: Moraceae



Las flores se desarrollan en el interior del sícono y son polinizadas por diminutas avispas especializadas (Agaonidae).

Etimología: El nombre del género *Ficus* deriva del nombre antiguo para el higo, una de las primeras plantas cultivadas por el hombre. La especie se refiere al nombre común dado al árbol en India.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Ásia



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGÍ	4: É	POC	CA L	LUV	IOS	A , (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octı	ubre	<u>:</u>
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
A Second		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ2	AS I	NUI	EVA	S					
A. S.						H	ЮJ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Psidium guajava

Familia: Myrtaceae



El fruto es una baya con numerosas semillas, las cuales son dispersadas por aves, murciélagos y otros mamíferos.

Etimología: El nombre del género *Psidium* deriva del nombre griego para la granada, por la forma y la presencia de muchas semillas. La especie deriva de su nombre taíno o arahuaco.

Uso: Alimenticia Origen: Nativa



MON	то	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII	OA I	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
A STATE OF THE STA		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* Comments						I	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{S}					

Nombre científico: Cedrela salvadorensis


Familia: Meliaceae



Especie muy escasa, en peligro de extinción. En Honduras solo se encuentra en forma natural en los cerros de Las Manzanillas en Comayagua y Guanacaure en Choluteca.

Etimología: El género *Cedrela* se refiere al diminutivo de la palabra "cedro". La especie se refiere a su origen geográfico.

Uso: Maderable, Ecológico



MON	ПO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	A L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYXE					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
X		."				F	ЮJ	AS	VIE	EJA	\mathbf{S}			."	."	

Nombre científico: Azadirachta indica


Familia: Meliaceae



Las semillas son fuente del compuesto químico azadiractina, utilizado como un insecticida biodegradable.

Etimología: El nombre del género *Azadirachta* deriva del nombre árabe dado al árbol y que significa "árbol noble". La especie se refiere a su origen geográfico.

Uso: Múltiple, Industrial **Origen:** Exótica de Ásia



MON	IТО	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	A L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	L FO	OLI	LAJ	E				
The same of the sa		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
* S		, in the second		, in the second		F	ЮJ	AS	VIE	EJA	S		, in the second			

Nombre científico: Albizia guachapele

Familia: Fabaceae Subfamilia: Mimosoideae



Presenta la corteza fisurada longitudinalmente, la cual se desprende en piezas grandes y encorvadas.

Etimología: El género *Albizia* honra al noble florentino del siglo XVIII, F. de Albizi. También se le denomina con el género sinónimo *Pseudosamanea*, que significa "samanea falso".

Uso: Maderable, Silvopastoril



MON	TTO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CAL	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	emb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	L FO	OLI	LAJ	E		•		
The same of the sa		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
X		."				I	ЮJ	AS	VII	EJA	S	, and the second				, and the second

Nombre científico: Tectona grandis

Familia: Lamiaceae




La madera es muy estable y resistente a la pudrición. Es una de las maderas más valiosas en el mercado.

Etimología: El nombre del género *Teca* significa "constructor" en griego, en referencia al uso que se le da a la madera. La especie se refiere al tamaño del árbol.

Uso: Maderable

Origen: Exótica de Ásia



MON	ГТО	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	A L	LUV	TIOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYXE		CAIDA DEL FOLLAJE														
		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	ΟJ	AS 1	NUI	E V A	S					
*						F	ЮJ	AS	VIF	EJA	S				."	

Nombre científico: Casuarina equisetifolia


Familia: Casuarinaceae



Aunque sus hojas se asemejan a acículas del pino y parezca una conífera, no lo es. Las hojas están tabicadas en septos.

Etimología: El género *Casuarina* deriva de la semejanza de las hojas con las plumas del casuario, un ave australiana, mientras que la especie se refiere a la similitud con la cola de un caballo.

Uso: Ornamental, Energética Origen: Exótica de Oceanía



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	L FO	OLI	LAJ	E				
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
X.						I	ЮJ	AS	VII	EJA	s					

Nombre científico: Muntingia calabura

Familia: Muntingiaceae



Posee frutos en baya, pardo-rojizos al madurar, alimento para aves y mamíferos, y apto para el consumo humano.

Etimología: El género *Muntingia* honra al botánico holandés del siglo XVII, A. Munting. La especie fue nombrada por Linnaeus, basándose en el trabajo del botánico inglés L. Plukenet.

Uso: Ecológico, Alimenticia



MON	ITO	REC) DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	IOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
Waster of the Control		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
*						I	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{S}					·

Nombre científico: Cassia grandis

Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae



Se utiliza para la elaborar refrescos con propiedades laxantes y también para combatir la anemia.

Etimología: El nombre del género *Cassia* deriva del término griego "kasia", utilizado por el botánico Dioscórides en el siglo I. El nombre de la especie se refiere al tamaño del árbol.

Uso: Ornamental, Medicinal



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGÍ.	A:É	POC	AL	LUV	IOS	Α, (AM	PUS	UNA	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
XXX					C	AII)A]	DEI	L FC	DLI	.AJ	E				
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC:	ГIF	ICA	CI	ÓΝ					
						н	OJ.	AS I	NUI	E V A	s					
A PARTIES						E	ЮЈ	AS	VIE	IJΑ	s					

Nombre científico: Mangifera indica

Familia: Anacardiaceae




Esta especie fue domesticada en la región asiática hace más de cuatro mil años, y traída al continente americano por los portugueses a finales del siglo XVIII.

Etimología: El nombre del género *Mangifera* significa "que tiene mangos". La especie se refiere a su origen geográfico.

Uso: Alimenticia

Origen: Exótica de Ásia



MON	TTO	REO	DE	FEN	OLO)GĹ	4: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
A STATE OF THE STA		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
X			Ü	Ü	Ü	H	ЮJ	AS	VII	EJA	S	Ü	Ü	Ü	Ü	

Nombre científico: Thevetia ahouai

Familia: Apocynaceae



Los llamativos frutos color rojo brillante y el látex blanco de las hojas y del tallo son venenosos.

Etimología: El nombre del género *Thevethia* honra al explorador francés del siglo XVI, A. Thévet. La especie proviene del término hindú para esta planta.

Uso: Ornamental Origen: Nativa



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGÍ.	A:É	POC	AL	LUV	TOS	A, C	AM	PUS	UNZ	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
XXX					C	AII)A]	DEI	L FO	OLI	۵AJ	E		•	•	
The state of the s		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC.	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ.	AS]	NUI	E V A	s					
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			, and the second		, and the second	E	ЮЈ	AS	VIE	ΞJΑ	s	, and the second		, and the second		

Nombre científico: Gliricidia sepium

Familia: Fabaceae Subfamilia: Faboideae



Es una de las especie multipropósito más utilizadas en el trópico. Posee hojas revolutas -bordes doblados hacia el envés-.

Etimología: El género *Gliricidia* significa "mata ratón" en latín, en referencia al uso de la planta para envenenar roedores. La especie significa "de las verjas", debido a su uso en cercas vivas.

Uso: Múltiple, Cercas vivas



MON	то	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	LAJ	E		•		
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* Company		· ·				H	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S	· ·	· ·	· ·		

Nombre científico: Byrsonima crassifolia


Familia: Malpighiaceae



Es polinizado por abejas nativas oligolécticas, especializadas en recolectar aceites florales. Posee frutos pulposos de color amarillo intenso y un fuerte aroma muy peculiar.

Etimología: El género *Byrsonima* se refiere a su uso para curtir cuero. La especie proviene del latín "hojas gruesas".

Uso: Alimenticia Origen: Nativa



MON	то	REC	DE	FEN	OL) OGĹ	4: Él	POC	CAL	LUV	TOS	A , (CAM	PUS	UN	4
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
)A I									
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC]	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ A	AS I	NUI	E V A	S					
X						H	ЮJ.	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Araucaria heterophylla

Familia: Araucariaceae




Es originaria de la isla Norfolk, en el Pacífico.

Etimología: El nombre del género *Araucaria* deriva de la provincia chilena de Arauco, donde se encontró la primera especie del grupo, Araucaria araucana. La especie se refiere a la forma variable entre las hojas y entre las edades del árbol.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Oceanía



MON	IТО	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É	POC	CA L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	:
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	۵	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
							FLO	OR/	\CI	ÓN						
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	s					
X						H	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{s}^{-}					

Nombre científico: Cordia collococca

Familia: Boraginaceae



Es una especie dioica, es decir que presenta flores masculinas y femeninas en plantas diferentes.

Etimología: El género *Cordia* está dedicado a los botánicos alemanes del siglo XVI, E. y V. Cordius. La especie significa "fruta pegajosa" por la consistencia mucilaginosa de la pulpa.

Uso: Maderable Origen: Nativa



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CAL	LU	TOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	emb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYX.					C	AII)A]	DEI	L F(OLI	LAJ	E				
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* S		· ·	· ·	· ·	· ·	I	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S	· ·			· ·	

Nombre científico: Cananga odorata

Familia: Annonaceae




El aceite destilado de las flores se usa como un ingrediente de varios perfumes famosos, como el Chanel No. 5.

Etimología: El género *Cananga* deriva del nombre común para el árbol en Malasia. El nombre de la especie significa "olorosa", en relación a la fragancia de las flores.

Uso: Industrial

Origen: Exótica de Ásia



MON	TTO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYX!					C	AII)A]	DEI	_ F(DLI	LAJ	E				
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
X.						I	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{s}					

Nombre científico: Sterculia apetala


Familia: Sterculiaceae



Es el árbol nacional de Panamá.

Etimología: El género *Sterculia* deriva de Sterculius, el dios romano del proceso de fertilización de los campos con el excremento de los animales domésticos. La especie se refiere a la aparente ausencia de pétalos de la flor.

Uso: Sombra, Alimenticia



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGÍ.	A: É	POC	A L	LUV	IOS	Α, (AM	PUS	UN	A
Mes		Jul	io			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
XXX					С	AII)A]	DEI	L FC	DLI	LAJ	E		•		
W.		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓΝ					
						н	OJ.	AS I	NUI	E V A	s					
A PARTIES				, i		I	ЮЈ	AS	VIE	EJA	s	·	·		·	

Nombre científico: Diion mejiae

Familia: Zamiaceae



En municipios de Olancho, las semillas de conos femeninos son procesadas para elaborar tamales y otros productos.

Etimología: El género *Dioon* proviene del griego "dos huevos", ya que las semillas vienen en par. La especie honra a I. Mejía, el primero en describir esta cícada arborescente del nuevo mundo.

Uso: Ornamental, Ecológica Origen: Nativa (Endémica)



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A , (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>,</u>
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
A STATE OF THE STA		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
· Comment						H	ЮJ	AS	VIF	EJA	S					

Nombre científico: Pachypodium geayi

Familia: Apocynaceae




Es originaria de la isla de Madagascar. No es una palma. Posee un llamativo tronco espinoso color gris metálico.

Etimología: El género *Pachypodium* deriva del griego "pie grueso", por el peculiar hinchamiento en la base del tronco. La especie honra al biólogo M. Geay, el primero en describirla.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de África



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
William .		BROTES														
							FLO	OR/	\CI	ÓN						
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS 1	NUI	E V A	S					
· Comment						I.	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{s}^{-}					

Nombre científico: Coccoloba uvifera


Familia: Polygonaceae



Es común en dunas y playas caribeñas. Posee frutos globosos comestibles, carnosos y dulces. Presenta estípula ócrea.

Etimología: El nombre del género *Coccoloba* deriva del antiguo nombre griego dado a la planta de la uva, la vid. El nombre de la especie significa "que tiene uvas", en referencia a los frutos.

Uso: Ecológica, Alimenticia



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
Was a series		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
*						I	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Stenocereus aragonii

Familia: Cactaceae



Es un cactus arborescente. Posee flores nocturnas cerca del ápice de los tallos y polinizadas por murciélagos.

Etimología: El nombre del género *Stenocereus* deriva del griego "stenos", angosto y el latín "cereus", candela. La especie honra al burócrata costarricense del siglo XIX, M. Aragón.

Uso: Ecológica, Ornamental



MON	то	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Nies		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	۵AJ	E				
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	ASI	NUI	E V A	s					
*						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Hibiscus rosa-sinensis

Familia: Malvaceae




Es la flor nacional de Malasia. Las flores duran solo un día. La planta posee mucílago, fibra soluble viscosa.

Etimología: El nombre del género *Hibiscus* deriva del griego "hibiskos", dado a la malva por Dioscórides, botánico del siglo I. La especie viene del latín y significa "originaria de China"

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Ásia



MON	то	REC	DE	FEN	OL) OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	_ F(DLI	۵AJ	E				
The same of the sa		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						H	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{S}					

Nombre científico: Spondias mombin


Familia: Anacardiaceae



Los frutos son drupas comestibles, amarillas y ácidas. Al estrujarse hojas liberan característico olor a mango.

Etimología: El nombre del género *Spondias* deriva del usado por el filósofo y botánico griego del siglo III a. C., Teofrasto. El término jocote proviene del náhuatl "xocotl", que significa fruto.

Uso: Alimenticia
Origen: Nativa



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYXE					C	AII)A]	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
The state of the s		CAIDA DEL FOLLAJE BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
*						F	ЮЈ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Thevetia peruviana

Familia: Apocynaceae



Los frutos son drupas que poseen dos semillas. Las flores son amarillas o naranjas, ligeramente perfumadas.

Etimología: El nombre del género *Thevetia* honra al explorador francés del siglo XVI, A. Thévet. La especie sugiere erróneamente que Perú es el lugar de origen de la planta.

Uso: Ornamental
Origen: Nativa



MON	IТО	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	į
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYXE		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
							FLO	OR A	\CI	ÓN						
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
X		, in the second				F	ЮJ	AS	VIE	EJA	S		, in the second	, in the second	, in the second	

Nombre científico: Salix humboldtiana

Familia: Salicacaceae



Es riparia, muy frecuente a lo largo de ríos y de sitios inundables. Presente en regiones tropicales y templadas.

Etimología: El nombre del género *Salix* viene del vocablo latín para sauce. La especie honra al geógrafo alemán del siglo XIX, A. von Humboldt. Anteriormente se le denominó *S. chilensis*.

Uso: Ecológica
Origen: Nativa



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É	POC	CAL	LUV	IOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
Water State of the		BROTES														
							FL()R/	\CI	ÓN						
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
X						H	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Lagerstroemia indica

Familia: Lythraceae




Es muy utilizada en jardines, con inflorescencias terminales o panículas rosadas con vistosos pétalos rizados.

Etimología: El nombre del género *Lagerstroemia* honra al naturalista sueco del siglo XVIII, M. von Lagerström. La especie sugiere erróneamente que la planta es originaria de India.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Ásia



MON	ITO	REO	DE	FEN	OLO) OGĹ	A: É	POC	AL	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	4
Nies		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	L FO	OLI	LAJ	E				
The same of the sa		BROTES														
							FLO	OR A	CI	ÓN						
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	s					
· All						F	ЮJ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Bougainvillea glabra

Familia: Nyctaginaceae




Posee coloridas brácteas, u hojas modificadas, ya sea moradas o rojas. La flor verdadera es blanca y diminuta.

Etimología: El nombre del género *Bougainvillea* honra al almirante francés del siglo XVIII, L. de Bougainville. La especie proviene del latín y significa "sin pelos", en referencia a las hojas.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Sudamérica



MON	ITO	REC	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	_ F(DLI	LAJ	E				
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	TIF	ICA	CI	ÓN					
		•				Н	OJ	AS I	NUI	E V A	s					
X						I	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Acrocomia aculeata


Familia: Arecaceae



La savia es extraída para elaborar el vino de coyol, bebida alcohólica muy tradicional en región de Olancho.

Etimología: El género *Acrocomia* significa "penacho", en referencia a la corona de hojas; y la especie "espinosa", por las espinas del tronco. Coyol proviene del náhuatl "coyolli", palmera.

Uso: Alimenticia, Ecológica



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre)
Samana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
N YX					C	AII)A]	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	E V A	s					
X						I	ЮJ	AS	VII	EJA	\mathbf{S}		T T	T T		

Nombre científico: Ravenala madagascariencis

Familia: Strelitziaceae




Se usa en jardinería por su peculiar aspecto tropical. Almacena agua en varias partes de la planta; y las hojas tienden a alinearse de este a oeste, por eso su nombre común.

Etimología: El nombre del género *Ravenala* se deriva del que se utiliza en Madagascar. La especie se refiere al origen geográfico.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de África



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É l	POC	CAL	LUV	IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	;
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
							FLC)R/	\C I	ÓN						
						FR	UC1	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ A	4S I	NUI	E V A	S					
X		T T		T.		H	ЮJ	AS	VIE	EJA	S	T.	T T			

Nombre científico: Musa acuminata x Musa balbisiana

Familia: Musaceae



Es una hierba perenne con un pseudotallo no leñoso.

Etimología: El género *Musa* deriva del árabe "Mauz", dado a la planta. La especie viene del latín "acuminatus", puntiagudo. También se honra al botánico italiano del siglo XIX, G. Balbis.

Uso: Alimenticia

Origen: Exótica de Ásia



MON	ITO	REO	DE	FEN	OL	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u> </u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	L FO	OLI	۵AJ	E				
Waste .		BROTES														
							FLO	OR/	ACI	ÓN						
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ.	AS I	NUI	EVA	S					
X						I	ЮJ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre cientifico: Murraya paniculata

Familia: Rutaceae



Es un arbusto de hojas perennes y flores blancas perfumadas, utilizado en jardines para formar setos o cercos.

Etimología: El nombre del género *Murraya* honra al botánico sueco del siglo XVIII, J. Murray, discípulo de Linnaeus. La especie viene del latín y significa "con flores dispuestas en panículas".

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Ásia



		TOREO DE FENOLOGÍA: ÉPOCA LLUVIOSA, CAMPUS UNA Julio Agosto Septiembre Octubre														
MON	TTO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É	POC	AL	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	4
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	:
Semana,	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
NYX!		CAIDA DEL FOLLAJE														
1		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	s					
A.						I.	ЮJ	AS	VIE	EJA	S					

Nombre científico: Allamanda cathartica

Familia: Apocynaceae




Posee flores amarillas en forma de trompeta, muy apreciadas en jardinería, que pueden ser tóxicas si son ingeridas.

Etimología: El género *Allamanda* honra al botánico suizo del siglo XVIII, F. Allamand. La especie proviene del griego "katharticos", que purifica, por las presuntas propiedades purgativas.

Uso: Ornamental

Origen: Exótica de Sudamérica



MON	то	REO	DE	FEN	OLO	OGĹ	A: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, C	AM	PUS	UN	A
Mes		Jul	io			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	:
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII) A]	DEI	_ F(DLI	۵	E				
The state of the s		BROTES														
							FLO	OR/	\CI	ÓN						
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
X					_	I	ЮЈ	AS	VII	EJA	\mathbf{s}^{-}					

Nombre científico: Persea americana

Familia: Lauraceae



Se considera originaria de México, aunque se ha cultivado en Centro y Sur América desde tiempos remotos.

Etimología: El género *Persea* deriva del nombre griego dado a un árbol egipcio. La especie se refiere al origen geográfico. El término aguacate proviene del náhuatl "ahuácatl", testículo.

Uso: Alimenticia



MON	m	RFO	DF	FEN	OLO)GÍ	4 · É	POC	'A I		TOS	A (AM	PUS	IN	A
Mes		Ju		1111	1	Ago		100		ptie					ubre	
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
							FL()R	ACI	ÓN						
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	OJ	AS I	NUI	E V A	S					
X.						I	ЮJ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Eugenia uniflora


Familia: Myrtaceae



Posee frutos rojos comestibles, globosos, de 6 a 8 costillas y una sola semilla. Es un arbusto muy utilizado en jardinería.

Etimología: El género Eugenia honra al aristócrata y militar francés del siglo XVIII, Eugene, príncipe de Saboya-Carignano. La especie significa "con una sola flor", en referencia a sus flores solitarias.

Uso: Ornamental, Comestible
Origen: Exótica de Sudamérica



MON	то	REC	DE	FEN	OLO	OGĹ	4: É	POC	CA L	LUV	TOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	j
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		CAIDA DEL FOLLAJE														
The state of the s		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
X.						I	ЮЈ	AS	VII	EJA	S					

Nombre científico: Cocos nucifera

Familia: Arecaceae



Posiblemente sea originaria de Asia, aunque el origen preciso se desconoce. Ampliamente distribuida en el trópico.

Etimología: El género *Cocos* deriva del coco o fantasma con que se asusta a los niños, por los agujeros de la semilla que asemejan a la cara de una criatura. La especie significa "que contiene nueces".

Uso: Alimenticia, Industrial Origen: Exótica de Ásia



MON	ITO	REC	DE	FEN	OLO) OGĹ	4: É	POC	CA L	LUV	TOS	A, C	CAM	PUS	UN	A
Mes		Ju	io			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A]	DEI	_ F(DLI	۵	E				
A STATE OF THE STA		BROTES														
		FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						н	OJ.	AS I	NUI	E V A	S					
* S		, in the second			, in the second	H	ЮJ	AS	VIE	EJA	S	, in the second				

Nombre científico: Albizia adinocephala

Familia: Fabaceae Subfamilia: Mimosoideae



Las hojas tienen una glándula cerca de la base.

Etimología: El género *Albizia* honra al noble florentino del siglo XVIII, F. de Albizi. La especie significa "con cabezas cercanas", en referencia a la distribución de las cabezuelas en las inflorescencias, las cuales son panículas terminales.

Uso: Silvopastoril, Ornamental




MON	то	REO	DE	FEN	OLO)GÍ	A: É	POC	CA L	LUV	'IOS	Α, (CAM	PUS	UN	A
Mes		Jul	lio			Ago	sto		Se	ptie	mb	re		Octi	ubre	<u>;</u>
Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					C	AII)A l	DEI	_ F(OLI	LAJ	E				
		BROTES														
		BROTES FLORACIÓN														
						FR	UC'	ГIF	ICA	CI	ÓN					
						Н	ΟJ	AS I	NUI	E V A	S					
* S		, in the second		, in the second	, in the second	H	ЮJ	AS	VIE	EJA	S			, in the second	, in the second	

Nombre científico: Plumeria alba

Familia: Apocynaceae





Es la flor nacional de Nicaragua, conocida en ese país como *sacuanjoche*. Las flores son más fragantes en la noche para atraer polinizadores, aunque en realidad no poseen néctar.


Etimología: El género *Plumeria* honra al botánico francés del s. XVII, Charles Plumier. La especie se refiere al color de sus flores.

Uso: Ornamental Origen: Nativa

Nombre científico: Corymbia citriodora

Familia: Myrtaceae





Se identifica fácilmente por la fuerte esencia cítrica que emanan sus hojas, conteniendo citronelal en un 80%.


Etimología: Anteriormente formaba parte de *Eucalyptus*. El género *Corymbia* se refiere a la inflorescencia dispuesta en corimbos o panículas. La especie hace referencia a su olor cítrico.

Uso: Maderable, Industrial **Origen:** Exótica de Australia

Nombre científico: Perymenium grande

Familia: Asteraceae





Es una de las maderas más durables y resistentes al ataque de insectos. Su madera es fluorescente a luz ultravioleta.


Etimología: El género *Perymenium* fue dado por H. Schrader en 1830. La especie se refiere al tamaño del árbol. Anteriormente la especie fue *strigillosum*, en referencia a lo áspero de las hojas.

Uso: Melífera, Maderable

Nombre científico: Acacia mangium

Familia: Fabaceae Subfamilia: Mimosoideae





Posee filodios (peciolos aplanados). Las verdaderas hojas aparecen únicamente en etapa de plántula.

Etimología: El género *Acacia* fue dado por el botánico griego Dioscórides en el siglo I A.C. y significa "planta espinosa". La especie es la latinización de la palabra mangle, por su parecido.


Uso: Maderable

Origen: Exótica de Australia

Nombre científico: Ziziphus jujuba

Familia: Rhamnanceae





La especie fue nombrada originalmente por Linnaeus como *Zizyphus* en el siglo XVIII, luego P. Miller clasificó erróneamente el género como *Ziziphus* (cambió la *y* por *i*).


Etimología: El género *Ziziphus* y la especie provienen del persa *zayzafun* y del latín *jujuba*, nombres dados al fruto,

respectivamente **Uso:** Alimenticia **Origen:** Asia

Nombre científico: Caesalpinia pulcherrima

Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae





Es la flor nacional de la isla caribeña de Barbados. La subfamilia *Caesalpinioideae* proviene de este género.


Etimología: El género *Caesalpinia* honra al botánico italiano del s. XVI A. Caesalpino, primer prefecto del jardín botánico de Pisa. La especie deriva del latín para hermoso o glorioso, por sus llamativas

Uso: Ornamental
Origen: Nativa

Nombre científico: Hymenaea courbaril

Familia: Fabaceae Subfamilia: Caesalpinioideae





Posee hojas bifoliadas, con dos hojuelas asimétricas, y vainas con una pulpa seca comestible y desagradable olor.


Etimología: El género *Hymenaea* deriva de Hymen, el dios griego del matrimonio, en referencia a las hojuelas pareadas. La especie proviene del nombre común dado en la Guayana Francesa

Uso: Alimenticia, Maderable

Nombre científico: Platymiscium dimorphandrum

Familia: Fabaceae Subfamilia: Faboideae





Posee hojas compuestas opuestas. Su madera es utilizada para elaborar teclas de marimba, por su resonancia.


Etimología: El género *Platymiscium*, dado por J. Theodor, botánico alemán del s. XIX, deriva del griego "legumbre con estípite aplanado". La especie proviene del griego "dos tipos de estambres".

Uso: Maderable Origen: Nativa

Nombre científico: Leucaena macrophylla

Familia: Fabaceae Subfamilia: Mimosoideae





Existen 7 especies nativas de leucaena en Centroamérica, con potencial para plantaciones.

Etimología: el nombre del genero Leucaena procede del griego leukos, que significa blanco refiriéndose al color de las flores. La especie significa hojas grandes.

Uso: Energética

Origen: Exótica de norteamérica

5.2 Rutas o senderos del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura

Esta ruta o sendero cuenta con dos recorridos, un recorrido corto (color rojo en el mapa) que consta de aproximadamente 930 metros de recorrido, el cual está diseñado para visitantes que no desean o no pueden realizar recorridos muy largos, sin embargo en este recorrido se podrá visitar muchas especies de interés económico y social. El sendero más largo (de color azul en el mapa) tiene una distancia de aproximadamente 2030 metros para aquellos amantes de la naturaleza que quieren visitar todas las especies presentes en este Arborétum (Figura 4).




Figura 4. Rutas de los dos senderos propuestos en el sendero de la Universidad Nacional de Agricultura

5.3 Mapa de todas las especies presentes en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.

Se elaboró un mapa en el cual se representa todas las especies de plantas de la Universidad Nacional de Agricultura que forman parte del Arborétum (Figura 5).




Figura 5. Mapa de los 563 árboles georreferenciados en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura

VI CONCLUSIONES

- a. El Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura cuenta con una alta biodiversidad de especies arbóreas, incluyendo especies exóticas, nativas y endémicas, lo cual lo coloca como uno de los mejores del país.
- b. Monitorear las etapas fenológicas de las especies presentes en el Arborétum y en general en el campus universitario ayudará en la reproducción in-situ y ex-situ de las especies arbóreas de interés o que se encuentre en peligro de extinción.
- c. La georreferenciación de las especies encontradas en el Arborétum da como resultado el tener la ubicación exacta de cada árbol, proporcionando un mayor control en las especies dentro del campus universitario.
- d. El Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura brinda una valiosa oportunidad de concientización ambiental para los estudiantes de la universidad y visitantes de la institución, permitiendo conocer la biodiversidad que tiene el país.

VII RECOMENDACIONES

- a. Gestionar recursos financieros con entidades nacionales e internacionales para apoyar las actividades del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.
- b. Promover que el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura sirva como un lugar turístico que el público lo pueda visitar y educarse ambientalmente.
- c. Realizar actividades de mantenimiento y cuidado de los rótulos para que no sufran deterioro y daños de origen antrópico.
- d. Mejorar las condiciones de los senderos incluyendo lugares de descanso para volver el recorrido por el Arborétum como una experiencia agradable.
- e. Utilizar medios de difusión para alcanzar un mayor reconocimiento del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.
- f. Implementar un programa de monitoreo permanente para obtener los cambios fenológicos que presentan las especies en diferentes épocas del año.

VIII BIBLIOGRAFÍA

Aldrovandi.U. Dendrología, 2013(en línea). Consultado el 01 de junio de 2013, Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/Dendrolog%C3%ADa:

Cadima, X. (ed), 2000. Memorias sobre el Curso Taller Conservación ex situ (Diciembre, 2000, Toralapa, Cochabamba, documento no publicado). Cochabamba, Bolivia. 19p

Caiza. E. 2011 Estudio dendrológico y fenológico de cinco especies nativas en el bosque, provincia de Chimborazo. Riobamba. Ecuador, (en línea), consultado 09 de junio de 2013, disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/CAIZA%20ELSA.pdf

Castillo, N y Castro, B. 1989. Estudio dendrológico y fenológico de las principales especies nativas del canton Saraguaro. Tesis de Ing. Forestal Loja Universidad Técnica de Loja, Facultad de ciencias Agricolas. Loja. Ecuador. 28 a 38 p.

Hawley, R 1982. Silvicultura práctica. Edit. Ediciones Omega S.A. Barcelona 48 p.

Jimenez. H. Jardín botánico de américa tropical.2008, (en línea), Consultado el 3 de junio de 2013.Disponible en: http://www.hjimenez.org/programacrjardin.html

Morales. P. 2010 Dendrología (en línea) consultado 02 de julio de 2013, disponible en: http://biologia.laguia2000.com/botanica/dendrologia

Otzet. J 2011 Conservación ex situ (en línea) consultado el 18 de junio de 2013 disponible en: http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=7&id=94

Ponce. M. 2004 Diseño técnico de un jardín botánico del bosque seco tropical en Zamorano Tesis de Ingenieria en desarrollo socioeconómico y ambiente Zamorano, Honduras, 6 p.

Pratt, L. Quijandria G. 1997. Sector Forestal en Honduras: Análisis de sostenibilidad. Honduras. 31 p.

Puertas. A 2009 Fenología (en línea) consultado 02 de julio de 2013, disponible en: http://www.ecometta.org/fenologia.html


Rivas.M 2001 Conservación in situ de los recursos fitogenéticos (en línea) consultado el 02 de julio de 2013 disponible en: http://www.fagro.edu.uy/~fitotecnia/%20apoyo/Conservacion_in_situ.pdf

Spelleberg, I.F and Hardes, SR 1992 Biological Conservation Cambridge UniversityPress

Theodore, D. 1982 Principios básicos de silvicultura. Primera edición. Edt. MeGraw H.W.S.A. Mexico.119 a 139 p.

Vásquez. B 2007 Fenología (en línea). Consultado el 02 de julio de 2013, Disponible en: http://www.uces.edu.ar/programaglobe/archivos/Fenologia%20Argentina.pdf

Wyse Jackson, P.S. & Sutherland, L.A. 2000. Agenda Internacional para la Conservación en Jardínes Botánicos. Organización para la Conservación en Jardines Botánicos (BGCI), UK



Anexo 1.Imágenes de la colocación de los rótulos del Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura



Elaboración de las 86 bases de PVC y cemento de los rótulos



Colocación de rótulo de Cereza de cayena en el Parquecito de la universidad



Detalle de la instalación de la base del rótulo



Vista panorámica del rótulo instalado



Toma de puntos con el GPS de los árboles del Arborétum

Anexo 2. Formato de hoja de campo para la recolección de datos fenológicos de setenta y seis especies en el Arborétum de la Universidad Nacional de Agricultura.

F	ormato de hoja de can	npo pa	ra la re	colec	cion de	e dato	s feno	logico)S		
Nombre comun	Nombre cientifico	Jur	nio		Ju	lio			Ag	osto	
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CAIDA D	DEL FOLLAJE										
BF	ROTES										
FLOF	ración										
FRUCTI	IFICACIÓN										
HOJAS	SNUEVAS										
HOJA	S VIEJAS										
CAIDA D	DEL FOLLAJE										
BF	ROTES										
FLOF	ración										
FRUCTI	IFICACIÓN										
HOJAS	HOJAS NUEVAS										
HOJA	S VIEJAS										
CAIDA D	DEL FOLLAJE										
BF	ROTES										
FLO	ración										
FRUCTI	IFICACIÓN										
HOJAS	NUEVAS										
HOJA	S VIEJAS										
CAIDA D	EL FOLLAJE										
BF	ROTES										
FLO	RACIÓN										
FRUCTI	IFICACIÓN										
HOJAS	NUEVAS										
HOJA	S VIEJAS										
CAIDA D	CAIDA DEL FOLLAJE										
BF	BROTES										
FLO	ración										
FRUCTI	FRUCTIFICACIÓN										
HOJAS	HOJAS NUEVAS										
HOJA	S VIEJAS										

Anexo 3. Límites del Arborétum de la universidad Nacional de Agricultura.

